

GUIA PARA LA VALORACIÓN DE

INFLAMACIÓN COMO CRITERIO ETIOLÓGICO

PARA EL DIAGNÓSTICO GLIM DE DESNUTRICIÓN

The Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)



ESPEN FACT SHEETS

GLIM y valoración de la INFLAMACIÓN

Mira



GLIM
FACT SHEET

Los criterios GLIM para el diagnóstico de desnutrición en adultos requieren cumplir al menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico

La valoración de la inflamación es uno de los criterios etiológicos GLIM



¿Cómo valoramos el cumplimiento del criterio GLIM etiológico INFLAMACIÓN?

La aparición de una enfermedad aguda o crónica, infección o lesión que se asocie a menudo o habitualmente con actividad inflamatoria puede cumplir este criterio. (i.e. no siempre es necesaria la confirmación mediante marcadores de laboratorio).


CONDICIONES CON INFLAMACIÓN AGUDA GRAVE O MODERADA

Grave: e.g. enfermedad crítica, infección/sepsis grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, quemaduras graves, cirugía abdominal mayor, politraumatismo, traumatismo craneoencefálico cerrado grave, pancreatitis aguda grave.

Moderada: enfermedades crónicas complicadas por exacerbaciones agudas moderadas, o nuevas presentaciones agudas con inflamación moderada asociadas a, e.g., enfermedad de Crohn, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pancreatitis, diabetes, infecciones, heridas, cáncer.


CONDICIONES CON INFLAMACIÓN CRÓNICA LEVE A MODERADA

e.g. insuficiencia cardíaca congestiva, fibrosis quística, EPOC, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, artritis reumatoide, diabetes, obesidad abdominal, síndrome metabólico, neoplasias malignas, infecciones como tuberculosis, VIH/SIDA, úlceras por presión, enfermedad periodontal, enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, pancreatitis leve/moderada, insuficiencia/trasplante de órganos

Cuando se disponga de pruebas recomendamos medir marcadores de laboratorio en casos inciertos para ayudar a confirmar el carácter inflamatorio de la enfermedad subyacente


CONDICIONES SIN INFLAMACIÓN CLARA O PERCEPTIBLE

e.g. diagnósticos psiquiátricos como anorexia nerviosa y depresión; enfermedades malabsortivas, obstructivas o de dismotilidad específicas como estenosis esofágica, síndrome de intestino corto anatómico; pseudoobstrucción intestinal; enfermedades neurológicas como disfagia tras accidente cerebrovascular.

Esta entidad no cumplirá el criterio de inflamación a menos que se confirme mediante análisis de laboratorio.

MARCADORES DE LABORATORIO QUE INDICAN INFLAMACIÓN



Niveles de PCR, indicadores alternativos de inflamación

Aplicación de la determinación de PCR

EN SITUACIONES AGUDAS

Niveles de PCR x 10 valor superior de referencia

PCR 10-50 mg/L = inflamación moderada

PCR > 50 mg/L = inflamación aguda grave

EN SITUACIONES CRÓNICAS

Medidas seriadas de PCR >valor superior de referencia

PCR 3.0-9.9 mg/L = inflamación leve

PCR 10-50 mg/L = inflamación moderada