



ESPE FACT SHEETS

MALNÜTRİSYONUN GLİM TANISI İÇİN İNFLAMASYONUN ETİYOLOJİK KRİTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KILAVUZ

The Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)

GLİM ve İNFLAMASYONUN değerlendirilmesi

Bakınız



GLİM
FACT SHEET

GLİM kriterlerine göre erişkinde
malnütrisyon tanısı için en az
1 fenotipik ve
1 etiyolojik
kriter gereklidir

İnflamasyonun değerlendirilmesi
GLİM için etiyolojik kriterden biridir



Etiyolojik GLİM kriteri olan İNFLAMASYON'un karşılanıp karşılanmadığını nasıl değerlendiririz?

İnflamatuvar aktiviteyle ilişkili olarak görülen akut ya da kronik hastalıklar, enfeksiyonlar veya yaralanmalar bu kriterin karşılanması için yeterli olabilir (Bu durumda, laboratuvar bulgularıyla doğrulama her zaman zorunlu değildir)

CİDDİ VEYA ORTA
AKUT
İNFLAMASYONLU
DURUMLAR

ciddi: örn. kritik hastalık, majör enfeksiyon/sepsis, akut solunum sıkıntısı sendromu, ağır yanıklar, büyük abdominal cerrahi, çoklu travma, ciddi kapalı kafa travması, şiddetli akut pankreatit

orta: Crohn hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), pankreatit, diyabet, enfeksiyonlar, yaralar, kanser gibi hastalıklarla ilişkili olarak orta dereceli inflamasyonla seyreden akut alevlenmelerle komplike olan kronik hastalıklar veya yeni ortaya çıkan akut tablolar

HAFİF VE ORTA
KRONİK
İNFLAMASYONLU
DURUMLAR

örn. konjestif kalp yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, romatoid artrit, diyabet, abdominal obezite, metabolik sendrom, maligniteler, tüberküloz, HIV/AIDS gibi enfeksiyonlar, bası yaraları, periodontal hastalık, kronik böbrek hastalığı, hepatik siroz, hafif/orta pankreatit, organ yetmezliği/nakli

BELİRGİN VEYA
ALGILANABİLİR
İNFLAMASYONU
OLMAYAN
DURUMLAR

örn. Anoreksiya nervoza ve depresyon gibi psikiyatrik tanılar; özofagus darlığı, anatomik kısa barsak sendromu, intestinal psödo-obstrüksiyon gibi malabsorptif, obstrüktif veya dismotilite durumları; serebrovasküler olay sonrası disfaji gibi nörolojik durumlar

Bu durum, laboratuvar analizleriyle doğrulanmadıkça inflamasyon kriterini karşılamaz.

Testlerin mevcut olduğu durumlarda, altta yatan hastalık veya durumun inflamatuvar özelliğini doğrulamaya yardımcı olmak için belirsiz vakalarda laboratuvar bulgularının ölçülmesini öneriyoruz.

İNFLAMASYON DÜŞÜNDÜREN LABORATUVAR BÜLGULARI



CRP seviyeleri,
Alternatif
inflamasyon
göstergeleri

CRP testinin kullanılması

AKUT DURUMLAR İÇİN
CRP seviyeleri x10 kat yüksek referans değeri

CRP 10-50 mg/L = Orta akut
inflamasyon

CRP > 50 mg/L = Ciddi akut
inflamasyon

KRONİK DURUMLAR İÇİN
Seri CRP ölçümleri > üst referans değeri

CRP 3.0-9.9 mg/L = hafif
inflamasyon

CRP 10-50 mg/L = orta
inflamasyon