



ESPEN FACT SHEETS

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL DOMICILIARIA (NPD)

Recomendaciones operativas según las guías de ESPEN

La implementación de la NPD sigue un proceso estructurado de cuatro pasos para garantizar la adecuación clínica, la preparación logística y la seguridad del paciente.

1

Indicación de la NPD y consentimiento informado del paciente

Identificar los casos clínicos adecuados y obtener el consentimiento informado del paciente

Indicación clínica



FIC benigno
FIC maligno
(con intención curativa o paliativa)

✗ Condiciones no relacionadas con FIC: la NPD no está recomendada.



Objetivos

Salvar vidas en el FIC

Mejorar la tolerancia al tratamiento y evitar la muerte relacionada con desnutrición en oncología.



Informar al paciente sobre

- Beneficios / Riesgos
- Procedimientos y cuidados
- Eventos adversos
- Documentación del consentimiento informado.



2

Confirmación de la viabilidad de la NPD

Evaluar si las condiciones del hogar y la capacidad del paciente/cuidador permiten una NPD segura.



Confirmar la estabilidad clínica y metabólica del paciente.

Involucrar al médico remitente con el equipo multidisciplinar de soporte nutricional (ESN).



Evaluar la capacidad del paciente y cuidador para manejar la NPD.



Valorar la adecuación del contexto domiciliario


Identificar los proveedores de NPD (bolsas de PN, bombas de infusión, accesorios) y el pagador.



3

Implementación y organización de la NPD

Preparar los dispositivos médicos y los sistemas logísticos necesarios para iniciar la NPD.



Elegir y colocar el DAVC

Elegir el dispositivo de control de infusión.



Definir y prescribir la composición y el calendario de la NPD/SIV.



Coordinar la logística de pedidos y entregas.

Educación al paciente sobre los roles del ESN hospitalario



4

Formación, monitorización y manejo de emergencias en NPD

Educar y apoyar a los pacientes y cuidadores para proporcionar una NPD segura.

Formación sobre el manejo del DAVC y la infusión de NPD/SIV.



Educación del paciente/cuidador sobre autocuidado y manejo de situaciones urgentes

Monitorización regular por parte del ESN (en consulta/ambulatorio).



Educación del paciente/cuidador y de las redes hospitalarias locales sobre el manejo de complicaciones.



Abreviaturas: FIC: Fallo Intestinal Crónico; ESN: Equipo de Soporte Nutricional; DAVC: Dispositivo de Acceso Venoso Central; SIV: Soporte Intravenoso; NP: Nutrición Parenteral.